ACiLS

(PR_E-)AUD²IT-Basisalgorithmus

P – Präparation

- Notfallmedikamente
- Notfallsonographie
- Materialcheck
- Alarmierung des Schockraumteams

PSA

- Einmalhandschuhe
- Schutzbrille
- Mundschutz
- ggf. Einmalkittel

R – Ressourcen

Information der Transferstellenpartner

- Intensivstation
- Diagnostik (Radiologie)
- Blutprodukte
- Labor

_ – Team-Time-Out I

- Vorbereitung abgeschlossen?
- Team vollständig?
- Ersteindruck (5-second round)
- Übergabe

E – Erstversorgung

primary survey

- **A** Airway - freie Atemwege
- **B** Breathing - Oxygenierung/Ventilation
- **C** Circulation - Hämodynamik
- **D** Disability - Vigilanz
- **E** Exposure & Environment - Entkleiden, Inspektion und Wärmemanagement

Monitoring

1. SpO_2
2. EKG
3. NIBD
4. Temp.

Labor

- Venöse BGA

- – Team-Time-Out II

- Zustand *stabil* vs. *kritisch*
- Priorisiere ABCDE
- Formuliere Leitsymptom

A – Anamnese

SAMPLER, OPQRST

U – Untersuchung

Untersuchung und Reassessment

D² – Differentialdiagnose

LOD-Karte nach Leitsymptomen

Diagnostik

EKG, POCUS, Röntgen, Computertomographie

secondary survey

I – Team-Time-Out III

- Zustand *stabil* vs. *kritisch*
- Formuliere Arbeitsdiagnose

I – Interpretation

T – To Do

- Definitive Therapie nach Leitlinie
- regelmäßiges Reassessment

CC BY NC ND
2022 DGINA Services UG

Autoren: Ingmar Gröning, Henning Biermann, Mark Michael; basierend auf Gröning, I et. al. Das (PR_E-)AUD2IT-Schema als Rückgrat für eine strukturierte Notfallversorgung und Dokumentation nichttraumatologischer kritisch kranker Schockraumpatienten. Notfall Rettungsmed 2022; 25: 491-498